

Kytta-Balsam® f



Liebe Patientin, lieber Patient!

Bitte lesen Sie folgende Gebrauchsinformation aufmerksam, weil sie wichtige Informationen darüber enthält, was Sie bei der Anwendung dieses Arzneimittels beachten sollen. Wenden Sie sich bei Fragen bitte an Ihren Arzt oder Apotheker.

Zusammensetzung

Arzneilich wirksame Bestandteile:

100 g Kytta-Balsam® f enthalten Beinwellwurzel-Fluidextrakt (1:2) 35,0 g (Auszugsmittel: Ethanol 60 Vol.-%), Methylnicotinat 1,2 g.

Sonstige Bestandteile:

Erdnussöl, Eukalyptusöl, Fichtennadelöl, Lavendelöl, Bergamottöl, weitere Geruchsstoffe als Bestandteile des Parfümöls Spezial, PH 2032791 Drägooco, Glycerol-1-stearat, Natriumdodecylsulfat, Cetylstearylalkohol (Ph. Eur.), 2-Phenoxyethanol- (butyl, ethyl, methyl, propyl) (4-hydroxybenzoat) [72:(4:4:2:16:2)], gereinigtes Wasser (Ph. Eur.).

Darreichungsform und Inhalt

Packung mit 50 g Creme (N1)
Packung mit 100 g Creme (N2)
Packung mit 150 g Creme (N3)

Stoff- oder Indikationsgruppe oder Wirkungsweise

Der in Kytta-Balsam® f enthaltene Wirkstoff Beinwellwurzel-Fluidextrakt dient zur äußerlichen Anwendung gegen Entzündungen, Schwellungen und Schmerzen. Der Wirkstoff Methylnicotinat fördert die lokale Durchblutung.

Pharmazeutischer Unternehmer

Merck Selbstmedikation GmbH
Röbberstraße 96
64293 Darmstadt
Tel.-Nr.: 0 61 51/8 56-260
Fax-Nr.: 0 61 51/8 56-203
www.merckselbstmedikation.de

Hersteller

Merck Kommanditgesellschaft auf Aktien + Co.
Werk Spittal
A-9800 Spittal/Drau

Anwendungsgebiete

Zur Behandlung von schmerzhaften Muskel- und Gelenksbeschwerden. Prellungen, Zerrungen und Verstauchungen (nach Abklingen der akuten Phase). Zur lokalen Durchblutungsförderung.

Gegenanzeigen

Wann dürfen Sie Kytta-Balsam® f nicht anwenden?
Bei bekannter Überempfindlichkeit gegen Beinwell, Methylnicotinat, Parabene oder einen der sonstigen Inhaltsstoffe von Kytta-Balsam® f darf das Arzneimittel nicht angewendet werden.

Bei Kindern unter 12 Jahren soll Kytta-Balsam® f nicht angewendet werden.

Wie müssen Sie in der Schwangerschaft und der Stillzeit beachten?

Die Anwendung in der Schwangerschaft sollte nur nach Rücksprache mit dem Arzt erfolgen; eine Langzeitbehandlung auf großen Flächen soll vermieden werden.

Was ist bei Kindern zu berücksichtigen?

Bei Kindern unter 12 Jahren soll Kytta-Balsam® f nicht angewendet werden.

Vorsichtsmaßnahmen für die Anwendung und Warnhinweise

Welche Vorsichtsmaßnahmen müssen beachtet werden?

Kytta-Balsam® f soll nicht in die Augen, auf Schleimhäute oder auf offene Wunden aufgetragen werden.

Die Anwendung darf nur auf intakter Haut erfolgen. Nach der Behandlung Hände waschen.

Worauf müssen Sie noch achten?

Kytta-Balsam® f ist nur zur äußerlichen Anwendung bestimmt!

Bergamottöl kann die Empfindlichkeit der Haut gegenüber UV-Licht steigern (natürliches oder künstliches Sonnenlicht). Aufgrund des Gehaltes an Methyl-, Ethyl-, und Propyl-4-hydroxybenzoat (Parabene) kann es zu allergischen Reaktionen, auch mit Verzögerung kommen.

Aufgrund des Gehaltes an Alkohol kann die häufige Anwendung des Arzneimittels auf der Haut Reizungen oder Entzündungen und Hauttrockenheit verursachen.

Was sollte bei Kindern beachtet werden?

Kytta-Balsam® f soll bei Kindern unter 12 Jahren nicht angewendet werden.

Wechselwirkungen mit anderen Mitteln

Eine Kombination mit anderen Hyperämika oder Mitteln zur physikalischen Wärmerotherapie kann zu einer übermäßigen Hautreizung führen.

Dosierungsanleitung, Art und Dauer der Anwendung

Die folgenden Angaben gelten, soweit Ihnen Ihr Arzt Kytta-Balsam® f nicht anders verordnet hat. Bitte halten Sie sich an die Anwendungsvorschriften, da Kytta-Balsam® f sonst nicht richtig wirken kann!

Wieviel und wie oft sollten Sie Kytta-Balsam® f anwenden?

Je nach Größe der zu behandelnden Körperstelle und nach Stärke der Beschwerden einen Salbenstrang von 2-4 cm Länge auftragen. Die Anwendung kann 2-4mal täglich erfolgen.

Wie und wann sollten Sie Kytta-Balsam® f anwenden?

Kytta-Balsam® f auf die schmerzhaften Körperstellen auftragen. Wichtig ist die Einreibung vor dem Schlafengehen.

Wie lange sollten Sie Kytta-Balsam® f anwenden?

Die Anwendung kann bis zum Abklingen der Beschwerden oder nach Anweisung des Arztes weitergeführt werden.

Nebenwirkungen

Welche Nebenwirkungen können bei der Anwendung von Kytta-Balsam® f auftreten?

Sehr geehrte Patientin, sehr geehrter Patient,

Weitere interessante Informationen und Tipps zum Thema „Muskel- und Gelenksbeschwerden“ haben wir für Sie in einem **kostenfreien** Ratgeber zusammengestellt.

Fordern Sie den Ratgeber „Muskel- und Gelenksbeschwerden“ **gratis** an:

Merck Selbstmedikation GmbH
Kytta-Patienten-Service
Röbberstr. 96
64293 Darmstadt
Tel: 0 61 51/8 56-260, Fax: 0 61 51/8 56-203

Weitere Informationen zu unseren Produkten finden Sie auch im Internet unter www.kytta.de.

Bitte senden Sie mir kostenfrei den Kytta-Ratgeber „Muskel- und Gelenksbeschwerden“

Name, Vorname _____

Adresse _____

E-Mail _____

Telefon _____

(Bitte in Druckbuchstaben ausfüllen)

Wie alle Arzneimittel kann Kytta-Balsam® f Nebenwirkungen haben.

Bei der Bewertung von Nebenwirkungen werden folgende Häufigkeitsangaben zugrunde gelegt:

Sehr häufig: Mehr als 1 von 10 Behandelten
Häufig: Mehr als 1 von 100 Behandelten
Gelegentlich: Mehr als 1 von 1.000 Behandelten
Selten: Mehr als 1 von 10.000 Behandelten
Sehr selten: 1 oder weniger von 10.000 Behandelten einschließlich Einzelfälle

In seltenen Fällen können Überempfindlichkeitsreaktionen (z.B. Hautreaktionen, Nesselsucht, Magen-Darm-Beschwerden, Schocksymptomatik mit Atemnot und Blutdruckabfall) auftreten. Aufgrund des Gehaltes an Erdnussöl kann es in seltenen Fällen zu lokalen Hautreaktionen (z. B. Kontaktdermatitis) kommen.

Wenn Sie Nebenwirkungen bei sich beobachten, die nicht in dieser Packungsbeilage aufgeführt sind, teilen Sie diese bitte Ihrem Arzt oder Apotheker mit.

Welche Gegenmaßnahmen sind bei Nebenwirkungen zu ergreifen?

Sie sollten die Behandlung abbrechen und gegebenenfalls einen Arzt über die Fortsetzung der Behandlung befragen.

Halbbarkeit

Das Verfallsdatum ist auf der Fallschachtel und auf der Tube aufgedruckt. Verwenden Sie diese Packung nicht mehr nach dem angegebenen Datum!

Halbbarkeit nach Anbruch des Behältnisses: 12 Monate.

Wie ist Kytta-Balsam® f aufzubewahren?

Arzneimittel bitte für Kinder unzugänglich aufbewahren.

Lagerungshinweis:
Nicht über 25°C lagern.

Stand der Information

Juni 2007

Dieses Arzneimittel ist nach den gesetzlichen Übergangsvorschriften im Verkehr. Die behördliche Prüfung auf pharmazeutische Qualität, Wirksamkeit und Unbedenklichkeit ist noch nicht abgeschlossen.



88154743Z / 17.01.0889.0003

